

P

Psoriasis

A

Area

S

Severity

I

Index

M

E

T

E

R

abbvie

PASI – Wie wird er gemessen?

Vorgehen bei der PASI-Berechnung

a) Die Bewertung des Schweregrades der Symptome Erythem, Schuppung und Infiltration erfolgt getrennt nach den vier Körperregionen Kopf, Rumpf, Arme und Beine und lässt sich folgendermaßen einordnen:

Score	Beteiligung
0	Keine
1	Mild
2	Mittel
3	Schwer
4	Sehr schwer

b) Die Abschätzung der von der Psoriasis befallenen Körperoberfläche erfolgt getrennt für die vier Körperregionen mit folgender Skalenbewertung:

Score	Beteiligung
0	Keine
1	1 % bis 9 %
2	10 % bis 29 %
3	30 % bis 49 %
4	50 % bis 69 %
5	70 % bis 89 %
6	90 % bis 100 %

Regeln für die PASI-Berechnung

- Wenn möglich, sollte ein Patient immer von demselben Untersucher bewertet werden.
- Postinflammatorische Hypo- oder Hyperpigmentierung wird als ‚0‘ gewertet (sofern keine Infiltration oder Schuppung vorhanden (s. Abb.1).
- Die ‚Hand-Methode‘: als Handfläche gilt die Handfläche des Patienten (s. Abb.2).
- Der Hals gilt als Teil des Kopfes, Achseln und Leisten gehören zum Rumpf und das Gesäß wird den Beinen zugeordnet.



Abb.1



Abb. 2

Berechnung des PASI

Der PASI berechnet sich aus der Summe der Schwere der Symptome für eine Körperregion multipliziert mit dem prozentualen Befall dieser Körperregion multipliziert mit einem Gewichtungsfaktor für jede Region (Kopf: 0,1; Arme: 0,2; Rumpf: 0,3; Beine: 0,4). Die Summe der so für jede Körperregion erhaltenen Zahl entspricht dem PASI (0 bis max. 72).

Erythem



1 = hellrot



2 = rot,
aber nicht dunkelrot






3 = dunkelrot



4 = düsterrot
(Umschlag nach violett)

Erythem



Schuppung



1 = vorwiegend feine
Schuppung auf einem
Teil der Läsion



2 = rauere
Schuppung auf einem
Großteil der Läsion






3 = raue, dicke
Schuppung auf einem
Großteil der Läsion



4 = sehr raue, sehr
dicke Schuppung auf
der gesamten Läsion

Schuppung



Infiltration



1 = 0,25 mm
(mild)



2 = 0,5 mm
(moderat)



3 = 1 mm
(schwer)



4 = 1.25 mm
(sehr schwer)

Für die Abschätzung des Befalls der einzelnen Körperregionen eignet sich die „Handmethode“

Kopf



1 Hand entspricht
ca. **10%**
des Kopfes

Arme



1 Hand entspricht
ca. **5%**
der Arme

Für die Abschätzung des Befalls der einzelnen Körperregionen eignet sich die „Handmethode“

Rumpf



1 Hand entspricht
ca. **3,3%**
des Rumpfes

Beine



1 Hand entspricht
ca. **2,5%**
der Beine

Wissenschaftliche Bearbeitung:

Prof. Dr. med.
Kristian Reich

Dermatologikum,
Hamburg

Prof. Dr. med.
Matthias Augustin

Universitätsklinikum
Eppendorf, Hamburg

© AbbVie Deutschland
GmbH & Co. KG

AbbVie Deutschland
GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2 a
65205 Wiesbaden
Tel.: (+49) 611 1720 0
Fax: (+49) 611 1720 1244
www.humira.de

7810017_1302

abbvie